

	項 目	回 答	備 考
1	年 齢	才	40才～90才が対象
2	性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
3	体 重(kg)	kg	
4	身 長(cm)	cm	
5	骨 折 歴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	身長以下の高さからの単純な転倒などによる骨折
6	両親の大腿骨近位部骨折歴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	身長以下の高さからの転倒などによる股関節の骨折
7	現 在 の 喫 煙	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
8	糖 質 コ ル チ コ イ ド	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プレドニゾン等の錠剤の数週間以上服用の有・無
9	関 節 リ ウ マ チ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	関節リウマチの確定診断がなされている場合のみ「有」 ※ 変形性関節炎ではない
10	続 発 性 骨 粗 鬆 症	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	骨粗しょう症と強い関係がある疾患、例えば、1型糖尿病、成人での骨形成不全症、長期にわたる未治療の甲状腺機能亢進症、性機能低下症あるいは早発閉経（45歳未満）、慢性的な栄養失調あるいは吸収不良ないしは慢性肝疾患があれば「有」
11	ア ル コ ー ル (1日3単位以上)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1単位の目安は8～10g。これはグラスビール1杯(285mL)、蒸留酒シングル(30mL)、グラスワイン(120mL)あるいは食前酒1杯(60mL)に相当します
12	骨 密 度 (BMD)		任意（わからなければ結構です）
今後10年以内に骨粗鬆症による骨折をする可能性			%
今後10年以内に股関節を骨折する可能性			%